

낙상 위험을 높일 수 있는 약물

특정 약품은 낙상의 위험을 높일 수 있으므로 과거에 낙상한 경험이 있는 경우에는 복용해서는 안됩니다. 그 약품들은 졸리게 하거나 어지럼증을 유발할 수 있습니다. 또한 정신적 인식상태를 감소시킬 수도 있습니다.

낙상으로 인해 병원 입원 횟수가 늘어나고 의료 비용 또한 늘어날 수 있습니다. 일부 일반적인 다음의 약품들은 낙상의 위험을 증가시킬 수 있습니다:



발작 치료제:

- carbamazepine (Tegretol)
- divalproex (Depakote)
- gabapentin (Neurontin)
- lamotrigine (Lamictal)
- levetiracetam (Keppra)
- pregabalin (Lyrica)
- topiramate (Topamax)

우울증 치료제:

- amitriptyline (Elavil)
- citalopram (Celexa)
- desvenlafaxine (Pristiq)
- duloxetine (Cymbalta)
- escitalopram (Lexapro)
- fluoxetine (Prozac)
- nortriptyline (Pamelor)
- paroxetine (Paxil)
- sertraline (Zoloft)
- venlafaxine (Effexor)

과거에 낙상한 적이 있고 이러한 약 중 하나를 복용하고 있다면 향후 낙상 위험을 낮추기 위해 할 수 있는 일에 대해 의사와 상담하십시오. 부작용이 있는 경우, 약을 바꾸는 것에 대해 의사와 상담하십시오.

질문이 있는 경우 OneCare 고객 서비스 무료번호 **1-877-412-2734 (TTY 711)** 로 7 일 24 시간 문의하십시오. 저희 직원이 귀하의 언어로 도와드립니다. 저희 웹사이트 www.caloptima.org/OneCare 를 방문하십시오.

기분 조절약:

- aripiprazole (Abilify)
- olanzapine (Zyprexa)
- quetiapine (Seroquel)
- risperidone (Risperdal)

불안감 조절약:

- alprazolam (Xanax)
- clonazepam (Klonopin)
- diazepam (Valium)
- lorazepam (Ativan)

수면제:

- eszopiclone (Lunesta)
- temazepam (Restoril)
- zaleplon (Sonata)
- zolpidem (Ambien)